

Termo de Consentimento para a Cápsula Endoscópica ou Enteroscopia por Cápsula (2 vias)

1) O que é o exame?

A cápsula endoscópica é um exame para avaliar o intestino delgado ou grosso e outros segmentos do tubo digestivo. O paciente engole uma cápsula com microcâmera que registra imagens e vídeos até ser eliminada nas fezes. As imagens são transmitidas 'sem fio' para um gravador preso à cintura.

Vantagem principal: visualizar áreas que a endoscopia alta e a colonoscopia não alcançam.

2) Para que serve?

- Investigar sangramentos digestivos sem causa definida em outros exames.
- Avaliar inflamações (ex.: Doença de Crohn).
- Detectar tumores, pólipos e divertículos (Meckel).
- Avaliar doença celíaca.
- Auxiliar na interpretação de exames de imagem (tomografia, ressonância).

3) Como é realizado?

- O exame é indolor e feito após preparo.
- Na clínica, sensores são fixados no tórax e abdome, conectados a um gravador preso ao cinturão.
- O paciente engole a cápsula com água e pode manter atividades habituais, evitando:
 - movimentos bruscos,
 - campos magnéticos (ressonância),
 - retirada do equipamento.
- Durante o dia, anotar em ficha especial: refeições, sintomas (dor, azia, náusea), hora de dormir e acordar.
- Ao final, retornar no horário agendado para retirada do aparelho e entrega da ficha.

4) Preparo

- 24h antes: dieta leve, sem fibras (frutas com casca, verduras, sementes, saladas).
- Jejum de 12h para sólidos e líquidos escuros.
- Até 6h da manhã do exame: beber 3 copos de água e tomar medicações usuais.
- Após 6h: jejum total (nem água).
- Comparecer 20 min antes do horário agendado.
- Evitar cremes/loções no abdome (atrapalham sensores).
- Usar roupas confortáveis, de preferência duas blusas.
- Informar problemas de saúde, gravidez ou uso de medicamentos.

5) Riscos e contraindicações

O exame é seguro, com complicações em menos de 2% dos casos.

Risco mais comum: retenção da cápsula (estenoses/obstruções intestinais).

Efeitos raros: desconforto abdominal leve, náusea, dor, irritação na pele pelo cinturão.

- Contraindicações principais:

- Dificuldade para engolir (pode ser feita via endoscopia).
- Estenoses ou obstruções intestinais.
- Gravidez.
- Crianças menores de 4 anos.
- Marcapasso ou dispositivos eletrônicos implantáveis.

6) Resultado

- Disponível em até 10 dias úteis após devolução do equipamento.
- Pode ser antecipado em casos de sangramento ativo.
- São analisadas mais de 100 mil imagens por equipe especializada.

Posso recusar a realização do exame a qualquer momento, ciente de que isso pode prejudicar meu tratamento.

Todas as informações e resultados são sigilosos, conforme legislação vigente.

Ribeirão Preto, de de 20__.

Nome do paciente ou responsável

Médico responsável

RG ou CPF: _____